



地址：香港沙田大圍富健街18號仁安醫院大樓2樓

電話：2608 3211

傳真：2608 2330

網址：www.unionpac.org

電郵：pac@union.org

交通設施 Traffic Facilities

本院設有免費穿梭巴士，行走本院及大圍港鐵站。

Free Union Hospital Shuttle Buses run between the Hospital and Tai Wai MTR Station.

專線小巴 minibus : 68K (由沙田及大圍港鐵站開出)

(From Shatin and Tai Wai MTR Stations)

公共巴士 buses : 46P, 46X, 80, 80P, 85B, 87B, 89B, 249X, 281M, 286X, 287X



Accredited by The Australian Council on Healthcare Standards since June 2010



ISO 9001:2008 FS 66763

CCM / PAC(Y)1608



仁安醫院
UNION HOSPITAL

LOOK YOUR

BEST



Medical Specialists
You Can Count On

仁心、安心、貼您心

Caring • Reliable • Empathetic






服務範圍

- ◆ 抽脂
- ◆ 超聲波溶脂
- ◆ 水刀抽脂 /
- ◆ 自體脂肪轉移
- ◆ 肚皮/手臂收緊
- ◆ 營養師飲食建議

抽脂 手術對處理一些局部脂肪堆積現象十分有效，脂肪積聚的位置通常在小腹、腹部及大腿等部位。抽脂手術可選擇以全身或局部麻醉來進行，視乎抽脂的位置和範圍而定。一些先進的手術方法，可減少疼痛及流血機會，也會令手術更加安全。

值得注意的是，抽脂手術注重的是雕塑，令身體曲線更完美，並不是用於減肥。進行抽脂手術前，醫生會先評估接受手術者的皮膚緊緻度，再配合適當的術後護理，以避免出現皮膚鬆弛的現象。此外，營養師亦會同時提供術後個人飲食建議，令理想的體形可以長期保持。

進行抽脂手術前，醫生會依照應有的身體曲線，在每個部位以多個同心圓與斜線標示出欲抽取的脂肪。然後在預定抽脂的區域，注入含有局部麻醉藥、血管收縮劑與生理補充液的混合溶液，以提供有效的止痛、降低出血量及補充水份。



手術期間，醫生會利用一個約0.5厘米的切口，將抽脂管置入皮下，把皮下脂肪刮除及抽出。抽脂部位的瘀血一般會在1至2周內消除，而腫脹約在4至6周後便會消失。

自體脂肪轉移

想擁有理想的身體線條，除了抽走身體的多餘脂肪外，也可以在適當部位注入一些脂肪去改善體型。現有的注射物料中，自體脂肪是最理想的一種，可減少排斥機會。自體脂肪注射手術在無菌情況下進行，在小肚肚臍附近開一個3毫米的切口，透過特別的喉管抽取脂肪，並將脂肪注入有需要的位置（例如臀部、胸部）。視乎不同位置的吸收情況，醫生在注射時會多注入三至七成的脂肪，接受治療後的部位會有少許腫脹，腫脹情況一般在二至四星期後消失。

減肥後或多次懷孕的人士最容易出現肚皮鬆弛問題，透過手術可切除多餘的肚皮及皮下脂肪，並將鬆弛的肚皮收緊及美化。切除過多的皮膚後，醫生會在原來的位置重塑出新的肚臍。接受此手術的人士，須在手術後連續數個星期穿著緊身衣，以達至更佳的效果。

肚皮收緊